


El VIH y los hombres gais y bisexuales hispanos o latinos



De los **37 968 diagnósticos nuevos de infección por el VIH** en los EE. UU. y áreas dependientes,* el 21 % fue entre hombres gais y bisexuales hispanos o latinos.†‡ **

Aproximadamente 2 de cada 3 hombres gais y bisexuales hispanos o latinos que recibieron un diagnóstico de infección por el VIH tenían entre 13 y 34 años.




Los números se ajustaron estadísticamente para contabilizar las categorías de transmisión faltantes. La suma de los valores podría no ser equivalente al total de la subpoblación.

Si bien los diagnósticos de infección por el VIH se mantuvieron estables entre los hombres gais y bisexuales hispanos o latinos en general desde el 2014 hasta el 2018, las tendencias variaron por edad.



Tendencias por edad



* Samoa Estadounidense, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, la República de Palaos y las Islas Vírgenes de los EE. UU.
 † Los hispanos o latinos pueden ser de cualquier raza.
 ‡ Esta hoja informativa usa el término hombres *gais* y *bisexuales* para representar a los hombres gais, bisexuales y otros hombres que han reportado tener contacto sexual con otros hombres, de 13 años y mayores.
 ** Incluye las infecciones atribuidas al contacto sexual entre hombres y consumo de drogas inyectables (hombres que indicaron tener ambos factores de riesgo).
 †† Los cambios en las subpoblaciones con menos diagnósticos de infección por el VIH pueden llevar a un aumento o una reducción porcentual grande.
 ‡‡ En los 50 estados y el Distrito de Columbia.



Los hombres gays y bisexuales hispanos o latinos que no saben que tienen el VIH no pueden recibir el cuidado y tratamiento que necesitan para mantenerse sanos.



A fines del 2018, se estima que **1.2 MILLONES DE PERSONAS EN LOS ESTADOS UNIDOS** tenían el VIH.[#] Entre estas personas, 186 900 eran hombres gays y bisexuales hispanos o latinos.




4 de cada 5
gays y bisexuales hispanos o latinos sabían que tenían el virus.^{***}



Es importante que los hombres gays y bisexuales hispanos o latinos sepan si tienen el VIH para que puedan tomar medicamentos para tratarlo en caso de tenerlo. Tomar medicamentos para el VIH todos los días puede hacer que la carga viral llegue a niveles indetectables. Las personas que consiguen y mantienen una carga viral indetectable (o mantienen la supresión viral) pueden vivir muchos años y de manera saludable. Además, no tienen, efectivamente, ningún riesgo de transmitir el VIH a parejas sexuales VIH negativas.



En comparación con todas las personas con infección por el VIH diagnosticada, los hombres gays y bisexuales hispanos o latinos tienen aproximadamente las mismas tasas de supresión viral. De cada **100 hombres gays y bisexuales hispanos o latinos con infección por el VIH diagnosticada**:



Para comparar, de cada **100 personas en general con infección por el VIH diagnosticada**, **76** recibieron algo de atención médica para el VIH, **58** se mantuvieron bajo atención médica y **65** habían logrado la supresión viral. ^{##}

Hay varias dificultades que ponen a algunos hombres gays y bisexuales hispanos o latinos en mayor riesgo de contraer el VIH.

Racismo, estigma del VIH y homofobia



El racismo, el estigma del VIH y la homofobia pueden afectar negativamente a muchos hombres gays o bisexuales hispanos o latinos en cuanto a adoptar comportamientos de riesgo, saber si tienen la infección por el VIH, recibir atención médica para el VIH, y otros servicios necesarios.

Parejas sexuales mayores



Los hombres gays y bisexuales hispanos o latinos tienen más probabilidades de reportar que su última pareja sexual era mayor. Tener una pareja de mayor edad puede aumentar las probabilidades de exposición al VIH.

Tasas bajas de uso de la PrEP



Una cantidad pequeña de hombres gays y bisexuales hispanos o latinos reportó usar profilaxis preexposición (PrEP). Si se toma de la manera recetada, la PrEP es altamente eficaz para prevenir la infección por el VIH.

Acceso a los servicios de prevención y tratamiento del VIH



La situación migratoria, la pobreza, los patrones de migración, un nivel de estudios más bajo y las barreras de idioma hacen que para algunos hombres gays y bisexuales hispanos o latinos sea más difícil obtener acceso a los servicios del VIH.

¿De qué manera están los CDC cambiando las cosas para los hombres gays y bisexuales hispanos o latinos?



Recolectan y analizan datos, y monitorean las tendencias del VIH.



Dan apoyo a las organizaciones comunitarias que aumentan el acceso a las pruebas de detección y la atención médica del VIH.



Realizan investigaciones sobre la prevención y brindan directrices para aquellos que trabajan en la prevención del VIH.



Promueven la realización de la prueba, así como la prevención y el tratamiento del VIH mediante la campaña *Detengamos Juntos el VIH*.



Apoyan a los departamentos de salud y las organizaciones comunitarias con fondos para el trabajo de prevención del VIH y les proporcionan asistencia técnica.



Fortalecen los programas de prevención del VIH exitosos y apoyan los esfuerzos nuevos, que se financian a través de la iniciativa *Ending the HIV Epidemic*.

*** Incluye las infecciones atribuidas al contacto sexual entre hombres solamente. Entre los hombres hispanos o latinos con infección por el VIH atribuida al contacto sexual entre hombres y el consumo de drogas inyectables, 10 de cada 11 sabían que tenían el VIH.

En 41 estados y el Distrito de Columbia.

Infórmese más sobre los dos enfoques diferentes de los CDC para el proceso continuo de atención para el VIH en www.cdc.gov/hiv/pdf/library/factsheets/cdc-hiv-care-continuum.pdf.

Para obtener más información sobre los datos de vigilancia del VIH, lea la sección "Technical Notes" (Notas técnicas) de los informes de vigilancia del VIH en www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html.

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/hiv/spanish